

MIX PK 30-20 **FOSFITO**

CONCIME MINERALE COMPOSTO P-K-30-20 (LIQUIDO)

Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in H ₂ O	30%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in H ₂ O a basso tenore di biureto	20%

MIX PK 30-20 è un nutrimento completo che può essere somministrato sia per via fogliare che in fertirrigazione iniziando dalla ripresa vegetativa.

MIX PK 30-20 è in grado di aumentare la resistenza delle piante alle malattie.

MIX PK 30-20 mantiene la turgescenza del protoplasma e quindi delle cellule che sviluppano fitoalexine aumentando così la resistenza alla siccità, ai geli invernali e primaverili in quanto stabilizza i colloidali.

Grazie al bilanciato contenuto in Fosforo e Potassio aumenta la resistenza meccanica della pianta agli attacchi fungini regolarizzando di conseguenza anche il metabolismo ed il flusso proteico alterato dall'attacco stesso.

La presenza di Fosforo e Potassio stimolando a livello radicale la produzione delle lignine rende le radici più resistenti agli attacchi di marciumi.

MIX PK 30-20 attiva numerosi enzimi che sono responsabili dei processi metabolici per la sintesi e polimerizzazione degli zuccheri che vengono poi trasferiti negli organi di riserva.

MIX PK 30-20 favorisce l'accrescimento degli apici delle radici, rende i rami più vigorosi, migliora la lignificazione dei tessuti, aumenta l'induzione a fiore e la differenziazione delle gemme, favorisce l'allegagione.

Si consiglia la somministrazione a partire dalle prime fasi della ripresa vegetativa a dall'ingrossamento dei frutti.

DOSI E MODALITA' D'USO

POMACEE (PERO, MELO) Distribuire per via fogliare con irrorazioni ripetute a distanza di 10 – 15 giorni	Grammi 250 – 350 / ettolitro
DRUPACEE, ACTINIDIA, NOCCIOLO Distribuire per via fogliare con irrorazioni ripetute a distanza di 7 – 15 giorni	Grammi 250 – 350 / ettolitro
VITE DA VINO E DA TAVOLA Distribuire per via fogliare con irrorazioni ripetute a distanza di 7 – 15 giorni	Grammi 250 – 350 / ettolitro
AGRUMI ED ULIVO Distribuire per via fogliare con irrorazioni ripetute a distanza di 7 – 15 giorni	Grammi 200 – 300 / ettolitro
ORTICOLE E FLORICOLE Distribuire per via fogliare con irrorazioni ripetute a distanza di 7 – 15 giorni	Grammi 200 – 300 / ettolitro
CUCURBITACEE Distribuire per via fogliare con irrorazioni ripetute a distanza di 10 – 15 giorni	Grammi 200 – 300 / ettolitro
COLTURE INDUSTRIALI Eseguire le irrorazioni nella fase che precede la maturazione	Kg 5 – 7 / ettaro
FERTIRRIGAZIONE	KG 1 – 1,5 ogni 1000 METRI QUADRI

In serre e tunnel ridurre il dosaggio del 25%

SOMMINISTRAZIONE: FOGLIARE – FERTIRRIGAZIONE

N.B. MIX PK 30-20 è miscibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina ed agli olii minerali